

GRAN SEMINARIO DE CLAUSURA

2ª Parte

“Diagnósticos Morfológicos Instantáneos”


Jaime Prat

Respuestas

Zaragoza, 21 de Mayo de 2011

11


**Varón, 21 años. Tumor de 8 cm en hueso poplíteo.
¿Qué enfermedad tiene?**



Neurofibromatosis de tipo 1 - Neurofibroma


11

**Varón, 21 años. Tumor de 8 cm en hueso poplíteo.
¿Qué enfermedad tiene?**




Neurofibromatosis tipo 1 – Glándulas y Angiosarcoma

Tumor Ovárico Derecho ¿Diagnóstico?




Tumor mucinoso de bajo grado del apéndice

Tumor Ovárico Derecho ¿Diagnóstico?




Tumor mucinoso de bajo grado del apéndice



Tumor mucinoso de bajo grado del apéndice

13


Tumor Ovárico ¿Cuál es la lesión precursora?



Endometriosis (carcinoma de células claras)

13


Tumor Ovárico ¿Cuál es la lesión precursora?



Endometriosis (carcinoma de células claras)


14

¿Cuál es la mutación característica de este tumor?




***FOXL2* (tumor de células de la granulosa)**

14



Reticulina (tumor de células de la granulosa)

14




Inhibin

Tumor de células de la granulosa

14 ¿Cuál es la mutación característica de este tumor?


FOXL2

c.402C > G
(C134W)



15


30 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor seromucinoso borderline de tipo endocervical

15


30 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor seromucinoso borderline de tipo endocervical

15


30 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor seromucinoso borderline de tipo endocervical


16

58 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?



Metástasis de adenocarcinoma de cérvix


16



Adenocarcinoma de cérvix

16

58 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?




p16

Metástasis de adenocarcinoma de cérvix

17a


¿Cuál es el diagnóstico de estas dos lesiones?



Tumor seroso borderline - ovario

17b


¿Cuál es el diagnóstico de estas dos lesiones?



Implante peritoneal invasivo

18


Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor trofoblástico epitelióide

18


Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor trofoblástico epitelióide

18







Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor trofoblástico epitelióide

18


Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?



Tumor trofoblástico epitelióide

19


Labio mayor ¿Cuál es el diagnóstico?



VIN 3 bien diferenciado (*simplex*)

19


Labio mayor ¿Cuál es el diagnóstico?



VIN 3 bien diferenciado (*simplex*)

20

Tumor del hombro ¿Cuál es el diagnóstico?



Condrosarcoma mixoide extraesquelético (S. Cordoide)



